



КРАТКО

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Сорт Chandler представляет преимущество, заключающееся в хорошем качестве ореха и ядра, являясь при этом разновидностью, которая плодоносит на боковых ветвях, то есть является очень продуктивной. Качество его плодов соответствует стандартам рынка сбыта ореха столового и орехового ядра. До настоящего времени он находит свое распространение в бассейнах французского производства, будучи при этом ограниченным ввиду даты распускания почек, 8 дней до сорта Lara®. Чувствительности к бактериозу, а также ввиду риска опадения орехов с некротическим поражением, что наблюдалось на некоторых молодых плантациях. Данная разновидность прекрасно подходит для интенсивного метода ухода. Принимая во внимание сложившееся экономическое положение, а также его потенциал плодоношения и качество плодов, сорт Chandler является в настоящее время предметом проектов посадки.

Я люблю

* За исключением разновидности Ferno, ввиду моей чувствительности к бактериозу, я остро нуждаюсь в глубокой и качественной почве.

* я приспособлен к интенсивному методу ухода: высокая густота, осевая структура, метод плодовой шпалеры

* последовательный уход для хорошего роста и развития фруктового сада

Я не люблю

* низменности с морозами, повышающими мою чувствительность к бактериозу на плодах или приводящие к возникновению червоточин на стволе

* На некоторых видах почвы, а также при слишком низкой температуре в конце весны и начале лета, скорлупа ореха плохо деревенеет.

Андрей Буга

Официальный представитель

Тел: + 373 69 69 43 29

Тел: + 373 67 111 750

Email: andrei.buga@gmail.com

WEB: www.coulie.com

Сорт Chandler


Разновидность американского ореха

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛОД, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РЫНКА СБЫТА СУХОГО ОРЕХА СТОЛОВОГО, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЫНКА СБЫТА ЯДЕР ОРЕХА
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УНИВЕРСИТЕТ ДЕВИС, КАЛИФОРНИЯ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

ПЛОД

Плод продолговатой формы, со слабо выраженными краями скрепления скорлупы. Калибр ореха достаточно большой, достигая часто от 32 до 36 мм. Толщина скорлупы незначительна, но скорлупа хорошо скреплена. Ядро очень светлое и легко извлекается из скорлупы. Оно составляет 45 до 50% всего веса ореха. Обладает хорошими вкусовыми

Календарь



ПРОДУКЦИЯ


Тип плодоношения данного сорта на боковых ветвях позволяет деревьям начать плодоносить достаточно скоро, на пятый год. Потенциал продукции высокий и составляет в среднем 4,5 тонны сухих орехов с гектара.

РАССТОЯНИЕ ПРИ ПОСАДКЕ

Сорт Chandler прекрасно адаптирован для выращивания по системе плодовой шпалеры с расстоянием в 8 метров между рядами и 4 м – в ряд. Согласно данной системе, несущая структура, служащая опорой для плодовых веток, представляет собой стену, непрерывную вдоль всего ряда. Это один из методов рационализации операций по обрезке, которые механизированы, как и в случае сорта Lara®. Орех опыляется ветром. Следует комбинировать виды, способные к опылению, как, например, Meylannaise и Ronde de Montignac из расчета 2-3 дерева на 1 гектар под преобладающими ветрами.

ПОДРЕЗКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ

Данный вид прекрасно подходит для формирования осевой структуры. Она обеспечивает распределение плодоношения по всем боковым второстепенным ветвям, расположенным вдоль всего ствола. Для формирования осевой структуры,



Дерево

Крепость: достаточно слабая
Сильная базитония

Внешний вид («осанка»): полувызведенный

Тип плодоношения I: частично на концевых ветках, на концах веток

Дата позднего / раннего распускания почек: к началу апреля

Для данного вида характерна протерандрия, мужские и женские соцветия достаточно ранние, во второй половине апреля и в начале мая перекрываются лишь частично.


УРОЖАЙ

Речь идет о существенном этапе для получения качественной продукции. Орехи, предназначенные для рынка сбыта столовых сухих орехов или для рынка сбыта ядер орехов, следует собирать быстро, они не должны лежать на земле более трех дней. Орехи должны быть высушены сразу же после их сбора в сушильных аппаратах под воздействием теплого воздуха для доведения влагосодержания орехов до 12% влажности.

ХРАНЕНИЕ

После сушки, качество ореха может сохраняться на протяжении целого года, но для этого следует хранить орехи в скорлупе при температуре 10°C и уровне влажности 70%. Хранение плодов, очищенных от скорлупы, в форме ядер, осуществляется в темном месте при температуре между 4°C и 7°C, при уровне влажности – 70%.

УХОД



молодой побег следует настолько пригнуть, насколько позволяет его крепость.

ПОДРЕЗКА В КАЧЕСТВЕ УХОДА

Она крайне необходима для сохранения хорошего уровня качества плантации, в особенности, что касается калибра. Она способствует проникновению света внутрь дерева, что необходимо для индукции цветения для продукции следующего года. Для Chandler она начинается к 5-7 году, и проводится ежегодно вручную путем устранения ветвей во внутренней части дерева или слишком низко расположенных ветвей. При слишком большом количестве ветвей обрезка проводится также и механически путем скашивания по косой линии с использованием цикла ротации каждые 3-4 года, в зависимости от крепости фруктового сада.

PEPINIERES COULIÉ
Le Sorpt
19600 Chasteaux - France
Tél. : (33) 05 55 85 34 21
Fax : (33) 05 55 85 42 28
E-mail : info@coulie.com

